

Plaies légères

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

Dispositions minimales pour éviter leurs apparitions

- L'environnement du cheval est soigneusement observé : proscrire les clôtures en barbelés, des objets contendants sur le parcours, des objets mal fixés, pouvant prendre le vent et affoler les chevaux.
- Il faut songer à prendre des précautions lors de la mise au champ, et gérer les conflits hiérarchiques qui se produisent lors de rassemblements.

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Stratégie de traitement

En cas de plaie superficielle	En cas de plaie moyenne
<ul style="list-style-type: none"> • Savonnage : savon doux ou savon antiseptique, puis rincer • Appliquer un antiseptique ou un antibiotique en spray à usage local pendant quelques jours 	<ul style="list-style-type: none"> • Injecter un sérum antitétanique : systématique en cas de vaccination douteuse, sinon rappel de vaccination (consultez votre vétérinaire). • Couper largement les poils autour : ciseaux courbes, tondeuse, rasoir. Pendant cette opération, la plaie peut être recouverte d'une gaze pour la protéger (projections de poils à l'intérieur) • Effectuer un savonnage antiseptique à l'aide d'un savon antiseptique • Rincer abondamment. • Appliquer une crème ou un spray antiseptique ou antibiotique puis un pansement absorbant qui doit être changé fréquemment les premiers jours • Injecter une solution contenant des antibiotiques et éventuellement des anti-inflammatoires, pendant 5 jours

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Saignement excessif de la plaie : le sang est rouge vif et gicle, indiquant la lésion d'une artère
- La pénétration comprend toute l'épaisseur de la peau: il faudra suturer ou agraffer les bords de la plaie
- La blessure se situe sur ou contre une articulation: il s'écoule par la plaie un liquide filant ou mousseux (synovie)
- On voit les structures sous la peau
- Une pénétration a eu lieu dans la fourchette, près d'une articulation ou une gaine tendineuse
- Blessure sévère faite dans le bas du membre, sur ou en dessous du genou ou du jarret
- La blessure est sévèrement contaminée (poussière et graviers dans les genoux "couronnés")
- Une blessure apparemment mineure a développé de la chaleur et un gonflement et montre des signes d'infection
- Suspicion de fracture osseuse: le cheval refuse de se déplacer ou de déposer un pied sur le sol
- Le cheval boite fortement