

Toux

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ÉLEVAGE

Les mesures sanitaires de prévention contre cette affection	Les mesures médicales de prévention contre cette affection
<ul style="list-style-type: none"> • Logement et ambiance : <ul style="list-style-type: none"> • Respect des normes habituelles de logement • Éviter les poussières et sortir les chevaux de l'écurie lors du paillage des box • Donner du foin ou du préfané de qualité • Privilégier les litières sans poussière pour les chevaux sensibles • Respecter une quarantaine de 21 jours lors d'introduction de nouveaux chevaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccination contre la grippe et la rhinopneumonie : <ul style="list-style-type: none"> • Respect du protocole vaccinal pour l'ensemble des chevaux présents

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Identification de la maladie

- Toux (sèche ou grasse)
- Appétit diminué ou absent
- Écoulement nasal présent ou absent ; si présence : couleur et consistance
- Essoufflement + ou – important ; détresse respiratoire
- Cou tendu – nez dilaté
- Ronflement dans la gorge

Lors de présence d'un de ces signes, prise de température obligatoire des animaux atteints.

Stratégie de traitement

- **Toux sèche sans hyperthermie et appétit normal voire légèrement diminué :** sirop antitussif, éventuellement associé à un anti inflammatoire, un mucolytique, un bronchodilatateur
 - Mettre au repos et retirer de toute source de poussière (foin, paille)
 - Mettre au pré si possible
- **En cas de baisse d'appétit, température rectale élevée ou d'essoufflement :** intervention vétérinaire systématique

Évaluation de l'efficacité du traitement

- Nette amélioration des signes cliniques au bout de 48 heures
- Guérison clinique complète à la fin du traitement

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Pathologie de groupe
- Non-amélioration ou aggravation des symptômes au bout de 48 heures
- Rechute
- Apparition d'autres maladies
- Symptômes associés à des troubles respiratoires : avortements, signes neurologiques, signes digestifs